

DESCRIPTION DE TROIS ELATERIDAE NOUVEAUX [COL.]
DE LA COLLECTION DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
DE PARIS,

PAR M. E. FLEUTIAUX,
CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Anchastus Alluaudi nov. sp.

5^{mm}, 1/2. — Oblong, peu convexe; brun plus clair sur les élytres; pubescence jaune longue. Tête à ponctuation large, superficielle, ombiliquée; bord antérieur arqué, peu éloigné en labre. Antennes brunes, longues, comprimées à partir du 4^e article; 2^e et 3^e articles petits, égaux, globuleux; 4^e plus long que les deux précédents réunis; suivants graduellement allongés. Pronotum à peine aussi long que large à la base, arqué sur les côtés, graduellement rétréci en avant, peu convexe; ponctuation très large, très superficielle, nettement ombiliquée, écartée; angles postérieurs aigus, légèrement incurvés, très finement carénés près du bord externe. Élytres insensiblement rétrécis, arrondis et entiers au sommet; ponctués-striés; interstices pointillés. Dessous brun clair. Hanches postérieures fortement et très brusquement élargies en dedans. Pattes brun clair testacé.

Diégo-Suarez (Ch. Alluaud). Un exemplaire.

Voisin de *A. Humbloiti* Fleutiaux; brun; ponctuation du pronotum très superficielle, angles postérieurs très finement carénés. Plus grand et plus foncé que *A. minimus* Fleutiaux.

Anchastus unicarinatus nov. sp.

6^{mm}, 1/2. — Oblong, peu convexe; brun; pubescence grise. Tête à ponctuation dense, rugueuse, ombiliquée; bord antérieur arrondi, peu éloigné en labre. Antennes longues, testacées, filiformes; 2^e et 3^e articles petits, égaux, globuleux; 4^e deux fois plus long que les deux précédents ensemble; suivants graduellement allongés. Pronotum un peu plus long que large, trapézoïdal, peu convexe; ponctuation inégale, bien marquée, assez serrée; angles pos-

térieurs, longs, aigus, dirigés en arrière, longuement carénés près du bord externe. Élytres subparallèles, arrondis et entiers au sommet, fortement ponctués-striés; interstries rugueux. Dessous de même couleur. Pattes testacées.

Diégo-Suarez (Ch. Alluaud). Un exemplaire.

Très différent de *A. Alluaudi* par le pronotum plus long, nullement arrondi, sa ponctuation plus profonde et plus serrée, ses angles postérieurs plus longs, aigus, et longuement carénés pris en bord externe.

***Anchastus propinquus* nov. sp.**

5^{mm},3/4 à 6 mm. — Oblong, peu convexe; noir; pubescence jaune. Tête à ponctuation ombiliquée, irrégulièrement espacée; bord antérieur arrondi, peu éloigné du labre. Antennes testacées, longues; filiformes; 2^e article court globuleux; 3^e plus large et deux fois plus long; 4^e deux fois plus long que le précédent; suivants graduellement allongés. Pronotum aussi long que large à la base, peu rétréci en avant, faiblement arrondi sur les côtés, peu convexe; ponctuation bien marquée, peu profonde, peu serrée; angles postérieurs longs, non divergents, carénés le long du bord externe. Élytres faiblement arrondis et rétrécis en arrière, fortement ponctués-striés; interstries rugueux. Dessous brun, plus clair sur l'abdomen. Pattes testacé clair.

Madagascar (A. Sicard). Cinq exemplaires.

Ressemble à *A. unicarinatus*; mais appartient à la même division que *A. vicinus* Fleutiaux, par le 3^e article des antennes plus long que le 2^e, mais moins que le 4^e.